

2. IZPIT IZ FIZIKE II ZA ŠTUDENTE BIOKEMIJE

2. september 2010

Teorija

1. Izpelji enačbo za toploto, ki jo idealni plin izmenja pri izotermni spremembi. 1 m^3 plina pri tlaku 1 bar pri izotermni spremembi prejme 1 kJ toplote. Za koliko % se pri tem spremeni njegova prostornina?
2. Zapiši enačbo za električno silo med dvema nabitima točkastima delcema. Delca z nabojeoma $1 \mu\text{As}$ in $3 \mu\text{As}$ sta oddaljena 10 cm. Kje na zveznici obeh nabojev moramo postaviti tretji nabit delec, da nanj ne bo delovala električna sila?
3. Zapiši enačbo za navor na magnetno iglo v homogenem magnetnem polju. V katero smer glede na smer magnetnih silnic moramo postavimo magnetno iglo, da bo navor nanjo največji?

Enačbe

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{ds}{dt} \quad a = \frac{dv}{dt} \quad \omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} \\
 s &= s_0 + vt \quad \varphi = \varphi_0 + \omega t \\
 s &= s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad v = v_0 + at \quad \varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \quad \omega = \omega_0 + \alpha t \\
 \omega &= 2\pi\nu \quad v = \omega r \quad a_r = \frac{v^2}{r} \quad a_t = \alpha r \\
 \vec{F} &= m\vec{a} \quad \vec{M} = J\vec{\alpha} \quad \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \\
 F_g &= mg \quad F_{vzm} = kx \quad F_{lep} = k_{lep}F_p \quad F_{tr} = k_{tr}F_p \\
 J_{valj} &= \frac{1}{2}mr^2 \quad J_{krogla} = \frac{2}{5}mr^2 \quad J_{palica} = \frac{1}{12}ml^2 \quad J_{točka} = mr^2 \quad J = J^* + mr^{*2} \\
 \Delta W &= A' \quad W_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 \quad W_{pot} = mgh \quad W_{pr} = \frac{1}{2}kx^2 \quad W_{rot} = \frac{1}{2}J\omega^2 \quad A = \vec{F} \cdot \vec{s} \\
 \Delta \vec{G} &= \vec{F}\Delta t \quad \vec{G} = m\vec{v} \\
 \Delta \vec{\Gamma} &= \vec{M}\Delta t \quad \vec{\Gamma} = \vec{r} \times \vec{G} = J\vec{\omega} \\
 \vec{r}^* &= \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \\
 F_g &= \frac{Gm_1 m_2}{r^2} \\
 p &= p_0 + \rho gh \quad p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{konst.} \\
 F_{vzg} &= \rho Vg \\
 F_u &= \frac{1}{2}C_u \rho S v^2 \quad F_u = 6\pi\eta r v \quad Re = \frac{l\rho v}{\eta} \\
 t_0 &= 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad t_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad s = s_0 \sin \omega t \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{t_0} \\
 c &= \lambda\nu \quad c = \sqrt{\frac{F}{\rho S}} \quad s = s_0 \sin(kx - \omega t) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \\
 s_1 - s_2 &= N\lambda \quad s_1 - s_2 = \left(N + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad d \sin \alpha = N\lambda \quad d \sin \alpha = \left(N + \frac{1}{2}\right)\lambda \\
 \frac{\Delta l}{l} &= \frac{1}{E} \frac{F}{S} \quad \frac{\Delta l}{l} = \alpha \Delta T \quad \frac{\Delta V}{V} = \beta \Delta T \quad \beta = 3\alpha \\
 pV &= \frac{m}{M} RT \quad pV^\kappa = \text{konst.} \quad \kappa = \frac{c_p}{c_v} \quad c_p = c_v + \frac{R}{M} \quad W_n = mc_v T \\
 \Delta W &= A' + Q \quad A = -\int_{V_1}^{V_2} p dV \quad Q = mc\Delta T \quad Q = C\Delta T \quad Q = mq_t \quad Q = mq_i \\
 \eta &= \frac{A_{opr}}{Q_{dov}} \quad \eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2} \\
 P &= S\lambda \frac{\Delta T}{d} \\
 \vec{F}_e &= e\vec{E} \quad F_e = \frac{e_1 e_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 d^2} \quad W_e = eV \quad V = \frac{e}{4\pi\epsilon\epsilon_0 d} \\
 E &= \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0} \quad e = CU \quad C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d} \quad C = C_1 + C_2 \quad \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad W_e = \frac{e^2}{2C} \\
 U &= RI \quad R = \frac{\xi l}{S} \quad R = R_1 + R_2 \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad P = UI \\
 \mathbf{F} &= \Pi \times \mathbf{B} \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad B = \frac{\mu_0 NI}{l} \quad \mathbf{F} = e\mathbf{E} + e\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad \mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{M} \quad \mathbf{p}_m = NIS \\
 U_i &= -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad \Phi_m = NS \cdot \mathbf{B} \quad I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \quad U_{ef} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad \vec{P} = I_{ef} U_{ef} \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} \\
 k_1 \sin \alpha &= k_2 \sin \beta \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \quad \frac{h_1}{h_2} = \frac{a}{b}
 \end{aligned}$$